

КОНСОРТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ ПТАХІВ ЧИСТИХ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД У ЛІСАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

Досліджено консортивні зв'язки птахів з сосною звичайною у весняно-літній період в умовах Центрального Полісся. Всього виявили шість видів птахів-консортів сосни звичайної. Домінуючими видами є зяблик та синиця велика. Виявлено топічні та трофічні зв'язки, однак домінуючими є перший вид зв'язків. Основними проявами топічних зв'язків є відтворення акустичних сигналів та поза готовності. Найбільшу кількість топічних зв'язків виявили домінуючу орнітоконсорти. Форічні та фабричні зв'язки не зафіковано. У топоморфічній структурі домінуючими є дріміобіонти, у кліматоморфічній – сезонники. Панівною серед топоморф є група зоофагів.

Ключові слова: консорцій, орнітоконсорти, бюджет часу, топічні і трофічні зв'язки, топоморфи, кліматоморфи, Центральне Полісся.

Вступ. Видовий склад орнітоконсорцій змінюється за порами року. Вивчити загальні тенденції функціонування орнітоконсорцій не можливо без пізнання особливостей взаємодії орнітоконсортів із середовищем існування у ключові періоди. У функціонування консорції весняно-літній період має неабияке значення: основну частину часу птахи витрачають на будівництво гнізд, охорону гніздових територій, насижування яєць, вигодовування пташенят, що проявляється у різноманітті консортивних зв'язків.

Матеріал та методика. Об'єктом наших досліджень є консорція сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.). Тимчасові пробні площа розміром 30×30 м закладали у чистих соснових насадженнях [4].

Як основний метод дослідження консорцій, використовували хронометрування денного бюджету часу (DTB) птахів на один екземпляр деревної породи [1, 3]. За допомогою візуального спостереження фіксували бюджет часу птахів для кожного екземпляра деревостану (ядра консорції) впродовж усього світлового дня. Схему графічного зображення консорції запропонував В.В. Мазинг [5], з доповненнями В.Л. Булахова [1] та О.А. Губкіна [2].

Результати дослідження. Консорція сосни звичайної чистих соснових насаджень у весняно-літній період не відрізняється особливим різноманіттям серед видового складу птахів-консортів. У консорції сосни звичайної у весняний період зафіковано шість видів птахів: дятел звичайний *Dendrocopos major* L., вівчарик весняний *Phylloscopus trochilus* L., вівчарик-ковалик *P. collybita* L., мухоловка строката *Ficedula hypoleuca* L., синиця велика *Parus major* L., зяблик *Fringilla coelebs* L.

Домінуючими видами є зяблик та синиця велика – відповідно 71,29 % і 15,73 % DTB. Дятел звичайний, вівчарик-ковалик, мухоловка строката є субдомінантами – відповідно 3,66 %, 5,29 %, 3,77 % DTB. Частка вівчарика весняного є незначною і становить 0,55 % DTB (рис. 1).

Орнітоконсорти брали участь у топічних і трофічних зв'язках. У чистих соснових насадженнях у весняно-літній період на території Центрального Полісся спостерігали п'ять видів функціональної діяльності, а саме: один належить до трофічних, чотири – до топічних (поза готовності, відтворення акустичних сигналів, чистка пір'я та педальні переміщення). У весняно-літній період у фун-

кціонуванні консорції сосни звичайної чистих соснових насадженнях форичні та фабричні зафіковані не були.



Рис. 1. Загальний бюджет часу орнітоконсортів у чистому сосновому насадженні у весняно-літній період

Абсолютно домінуючим видом функціональної взаємодії з автотрофом у весняно-літній період є топічні зв'язки – 98,85 % DTB. У топічних зв'язках беруть участь шість зафікованих видів птахів (рис. 2). Топічна складова сосни звичайної характеризується домінуванням синиці великої та зябліка – відповідно 15,87 % та 71,29 % DTB топічних зв'язків. Дятел звичайний, вівчарик-ковалик, мухоловка строката виступають субдомінантами – відповідно 3,12 %, 5,35 %, 3,82 % DTB топічних зв'язків. Другорядним видом є вівчарик весняний і його частка є неістотною – 0,56 % DTB топічних зв'язків.



Рис. 2. Частка топічних зв'язків орнітоконсортів у чистому сосновому насадженні у весняно-літній період

Одним з основних проявів топічних зв'язків є відтворення акустичних сигналів – 57,47 % DTB топічних зв'язків. Домінування співу свідчить про те, що птахи контролюють свою територію у процесі внутрішньовидової конкуренції. Поза готовності (36,37 % DTB топічних зв'язків) також є домінуючою у функціональній взаємодії. Ця особливість свідчить про специфіку функціонування консорції сосни звичайної.

вання консорції сосни звичайної. Це пояснюємо особливостями будови крони сосни звичайної.

Найбільшу кількість топічних зв'язків (четири види) виявили домінанти консорції – синиця велика та зяблик. Три види топічних зв'язків (поза готовності, відтворення акустичних звуків, педальні переміщення) виявив вівчарик-ковалик. Решта видів птахів-консортів виявили по два види залежностей (поза готовності та відтворення акустичних звуків). Таким чином, консорція сосни звичайної у весняно-літній період має досить спрощений характер. Трофічна складова консорції сосни звичайної за видовим складом є біднішою за топічну. У функціонуванні таких зв'язків беруть участь три види із шести зафікованих (рис. 3).




Рис. 3. Частка трофічних зв'язків орнітоконсортів у чистому сосновому насадженні у весняно-літній період

Дятел звичайний і зяблик є домінуючими трофоконсортами – відповідно 50,13 % і 45,94 % DTB трофічних зв'язків. Субдомінантом є синиця велика (3,93 % DTB трофічних зв'язків). Характерно рисою для консорції сосни звичайної є велика участь видів, які полюють на поверхні стовбура (дятел звичайний) – 50,13 % DTB трофічних зв'язків. Ця особливість свідчить про те, що фітомаса сосни звичайної не є вагомим джерелом трофічної бази для птахів.

Серед топоморф домінуючими є дріміобонти – 100,00 % DTB (табл. 1). У клімаморфічній структурі домінують сезонники – 80,60 % DTB. Частка цілорічніх видів невелика і загалом становить 19,40 % DTB. Така особливість демонструє, що консорція сосни звичайної знаходиться під впливом поступової зміни характеру функціонування із зимового на літній. Трофоморфічний склад консорції сосни звичайної у весняно-літній період є неповним і представлений тільки однією трофічною групою з трьох – зоофагами (табл. 2). У складі трофоморф II порядку наявні нишпорники, глибокі нишпорники і засідники.

Табл. 1. Клімаморфічна характеристика сосни звичайної у весняно-літній період

Біоморфи II порядку	Частка у бюджеті, %
Сезонники	80,60
Цілорічні види	19,40
Всього	100,00

Найактивнішою виявилася група нишпорників, до складу якої увійшли представники першої, другої та третьої розмірних ланок. Їх загальна частка становить 92,57 % DTB. Найменш активними є глибокі обшарщики – 3,66 % DTB.

Табл. 2. Трофоморфічна характеристика орнітоконсорції сосни звичайної у весняно-літній період

Трофоморфи I порядку	Трофоморфи II порядку	Трофоморфи III порядку	Частка у бюджеті часу, %
Зоофаги	нишпорники	засідники	2 5,29
		2	16,28
		3	71,00
	глибокі нишпорники	5	3,66
	Всього зоофагів		100,00
Всього			100,00

Серед трофоморф III порядку домінуючими є друга (16,28 %) та третя (71,00 % DTB) розмірні ланки. Перша розмірна ланка представлена вівчариком-коваликом (5,29 % DTB), друга – вівчариком весняним, мухоловкою строкатою та синицею великою (їх загальна частка становить 20,05 % DTB), третя – зябликом (71,00 % DTB), п'ята – дятлом звичайним (3,66 % DTB). Відсутні представники четвертої та шостої розмірних ланок.

Висновки:

1. У функціонуванні консорції сосни звичайної у весняно-літній період у чистих соснових насадженнях беруть участь шість видів птахів. Домінуючими видами-консортами у весняно-літній період у чистих соснових насадженнях є синиця велика – 15,73 % DTB та зяблік – 71,00 % DTB. Топічні зв'язки у весняно-літній період є домінуючими – 98,85 % DTB.
2. У весняно-літній період у топоморфічній структурі орнітоконсорції сосни звичайної панують дрімобіонти – 100,00 % DTB.
3. У клімаморфічній структурі орнітоконсорції чистих соснових насаджень переважають сезонники – 80,60 % DTB.
4. Трофоморфічна структура консорції сосни звичайної у чистих соснових насадженнях є спрощеною, оскільки присутні тільки зоофаги (100,00 % DTB).

Література

1. Булахов В.Л. Консортивные связи в средообразующей деятельности позвоночных животных в степных лесах УССР / В.Л. Булахов // Значение консортивных связей в организации биогеоценозов : матер. II Всесоюз. совещания по проблеме изучения консорций. – Пермь : Изд-во ПГПИ, 1976. – С. 274-277.
2. Губкін О.А. Екологічна роль солончакових місце проживань в формуванні внутріконтинентальних лиманних орнітocomплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.16 – "Екологія" / О.А. Губкін; Дніпропетровський ДУ. – Дніпропетровськ, 1993. – 22 с.
3. Дольник В.В. Методы изучения бюджетов времени и энергии у птиц / В.В. Дольник // Труды Зоологического ин-та. – 1982. – Т. 113. – С. 3-37.
4. Климчук О.О. Про консортивні зв'язки птахів в осінній період у сосновому насадженні в умовах Центрального Полісся / О.О. Климчук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.2 – С 36-40.
5. Мазинг В.В. Консорции как элементы функциональной структуры биогеоценозов / В.В. Мазинг // Труды Московского Общества Испытателей Природы. – 1966. – Т. 27. – С. 117-126.

Климчук А.А. Консортивные связи птиц чистых сосновых насаждений в весенне-летний период в лесах Центрального Полесья

Исследован процесс формирования системы консортивных связей птиц в весенне-летний период в чистых сосновых насаждениях Центрального Полесья. Всего в составе

консорции сосны обыкновенной зафиксированы 6 видов птиц. Преобладающими видами являются большая синица и зяблик. Определено, что основными разновидностями консортивных связей птиц являются топические и трофические связи с доминированием первых. Основными проявлениями топических связей являются акустические звуки и поза готовности. Самое большое количество топических связей проявляют доминирующие орнитоконсорты. Форические и фабрические связи не зафиксированы. Функциональный состав птиц в консорциях характеризуется преобладанием дримобионтов и сезонных видов. Преобладающей среди трофоморф птиц в консорциях древесных пород является группа зоофагов.

Ключевые слова: орнитоконсорты древесных пород, консорции древесных пород, бюджеты времени, биоморфические группы птиц, топические и трофические связи, Центральное Полесье.

Klymchuk O.O. The Birds' Consortive Relationships withing Spring and Summer Period in the Pine Forests in the Central Polissya

The article is devoted to the process of forming the system of consortive relationships of birds in the individual consortia of pine *Pinus sylvestris* within spring and summer period under the Central Polissya conditions. As a result of studies 6 birds species were fixed in pine consortia. The dominant species are the Great Tit and Chaffinch. The relationships are mostly topic and trophic. The main manifestations of topical links are an acoustic signals and outside of readiness. The largest number of topical links are found by dominant bird species. Phoric and phabric connections are not fixed. Bird's functional composition in consortia is characterized by prevalence of dendrophiles and yearlings species. Zoophages are dominants among trophomorphs.

Keywords: birds-consorts species of the trees, individual consortia of a tree, time budgets, bird biomorfic groups, mostly topic and trophic relationships, the Central Polissya.